

Bibliografía

- Demyttenaere, K., Bonnewyn, A., Bruffaerts, R., De Girolamo, G., Gasquet, I., Kovess, V., et al. (2008). Clinical factors influencing the prescription of antidepressants and benzodiazepines: Results from the European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD). *Journal of Affective Disorders*, 110, 84-93.
- Fernández-Arias, I., Labrador, F.J., Estupiñá. F.J., Bernaldo de Quirós, M., Alonso, P., Blanco, C. y Gómez, P. (2013) Does adding pharmaceutical medication contribute to empirically supported psychological treatment for anxiety disorders?. *Psicothema*, 25, (3), 313-318.
- Kessler, R.C., Chiu, W. T., Dernler O., & Walters, E. E. (2005). Prevalence, severity, and comorbidity of twelve-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication (NCS-R). *Archives of General Psychiatry*, 62(6), 617-27.
- Ministerio de Sanidad y Consumo (2006). *Encuesta Nacional de Salud de España 2006*. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo.
- Ministerio de Sanidad y Consumo (2008). *Guía de práctica clínica para el manejo de los trastornos de ansiedad en atención primaria*. Madrid: Ministerio de Sanidad y consumo.
- Otto, M. W., Smits, J. A. J., & Reese, H. E. (2005). Combined psychotherapy and pharmacotherapy for mood and anxiety disorders in adults: Review and analysis. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 12(1), 72–86.
- Secades, R., Rodríguez-García, E., Valderrey, J., Fernández-Hermida, J., Vallejo, G., & Jiménez-García, J. (2003). El consumo de psicofármacos en pacientes que acuden a Atención Primaria en el Principado de Asturias (España). *Psicothema*, 15, 650-655.