

Referencias bibliográficas mencionadas en la entrevista:

Ascaso, C., García-Esteve, L., Navarro, P., Aguado, J., Ojuel, J y Tarragona, M. J. (2003). Prevalencia de la depresión postparto en las madres españolas, comparación de la estimación mediante la entrevista clínica estructurada y la escala de depresión postparto de Edimburgo. *Medicina Clínica (Barcelona)* 120 (9), 326-329.

Carrascon, A., Garcia, S., Ceña, B., Fornés, M. y Fuenteelsaz, C. (2006). Detección precoz durante el embarazo y el postparto. *Matronas Profesión*, 7(4), 5-11.

Gaillard, A., Le Strat, Y., Mandelbrot, L., Keïta, H. y Dubertret, C. (2014). Predictors of postpartum depression: Prospective study of 264 women followed during pregnancy and postpartum. *Psychiatry Research*, 215, 341-346.

Gavin, N. I., Gaynes, B. N., Lohr, K. N., Meltzer-Brody, S., Gartlehner, G., y Swinson, T. (2005). Perinatal depression: a systematic review of prevalence and incidence. *Obstetric & Gynecology* 106 (5), 1071-1083.

Le, H.N., Perry, D.F., Stuart, E.A. (2011). Randomized controlled trial of a preventive intervention for perinatal depression in high-risk latinas. *Journal of Consultant Clinical Psychology* 79, 135-141.

O'Hara, M.W. y Wisner, K.L. (2014). Perinatal mental illness: definition, description and aetiology. *Best Practice Research Clinical Obstetric Gynaecology*. 28(1), 3-12.

Pearlstein, T., Howard, M., Salisbury, A., Zlotnick, C. (2009). Postpartum depression. *American Journal of Obstetric Gynecology* 200(4), 357-364.